



สถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญ

- โรคไข้เลือดออก
- โรคคออักเสบ(ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนวัคซีน)
- dT



The term design means to plan or skilfully. Design is general of the applied arts, engineering other innovative activities.

นฤมล ฉายแสงเจริญ
งานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา


20 มกราคม 2558

โรคไข้เลือดออก



ประเทศไทยตั้งแต่ 1 - 11 ม.ค. 58


- พบผู้ป่วย 195 ราย จาก 36 จังหวัด
- อัตราป่วย 0.30 ต่อแสนประชากร
- ไม่พบเสียชีวิต
- พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี
- พบมากในกลุ่มนักเรียน



ที่มา: ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา

อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดยะลา จำแนกรายอำเภอ 1 ต.ค. 57-19 ม.ค. 58


อัตรา:แสนปชก.



ที่มา: ข้อมูลจากศูนย์ระบาดจ.ยะลา

อำเภอ

จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเครือข่ายอำเภอเมืองยะลา 1 ต.ค. 57- 19 ม.ค. 58




Legend - SUM_Case
1 Dot = 1

อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก เครือข่ายอำเภอเมืองยะลา 1 ต.ค. 57 – 19 ม.ค. 58

อัตราป่วย:แสนปชก.


เกณฑ์ :ไม่เกิน 80 ต่อแสนประชากร



จำนวนป่วยโรคไข้เลือดออกเครือข่ายอำเภอเมือง จำแนกตามกลุ่มอายุ

1 ต.ค. 57 - 19 ม.ค. 58


จำนวน



กลุ่มอายุ

จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเครือข่ายอำเภอเมือง จำแนกตามอาชีพ

1 ต.ค. 57 -19 ม.ค. 57



เดือน ธันวาคม 57 (11 ราย)

ศสม. (2) /รพ.สต. (9)	พื้นที่ที่พบผู้ป่วย
ศสม.ผังเมือง 4	ถ. ผังเมือง 5
ศสม.บ้านสะเตง	ถ. สุขยางค์
ท่าสาป	หมู่ 1
ลำใหม่	หมู่ 1
ลำพะยา	หมู่ 4
ลิคต	หมู่ 4
บุดี	หมู่ 3,7
สะเตงนอก	หมู่ 10
บาโจยบาเด	หมู่ 2
ทุ่งยามู	หมู่ 6

เดือนมกราคม 2558 (1 ราย)

ศสม./รพ.สต.	พื้นที่ที่พบผู้ป่วย
สระเตงนอก	หมู่ 4

**โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ
และหัดเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ
5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558**

ปัญหาที่ต้องรีบแก้ไข

- ❑ วัคซีนครอบคลุมไม่ทั่วถึง ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ชุมชนแออัด และชายแดนใต้ เสี่ยงที่โรคจะระบาด
- ❑ โรคคออักเสบเริ่มกลับมาระบาด ส่วนใหญ่พบในอายุ 26 ปีขึ้นไป 45.8 %
- ❑ โรคหัดยังระบาดเป็นระยะส่วนใหญ่พบในเด็กอายุ 0-7 ปี 44 %

ผู้ป่วยยืนยันโควิด ปี2556

จังหวัด	ป่วย	เสียชีวิต
ยะลา (รามัน)	2	1
ปัตตานี	3	2
นราธิวาส	3	1
สงขลา	4	0
สตูล	2	1
ตาก	1	0
ยโสธร	1	0
อุดรธานี	2	0
เชียงใหม่	1	1
กทม.	2	1

ผลการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

- กำหนดให้รณรงค์ฉีดวัคซีน dT จำนวน 1 ครั้ง
- ในผู้ใหญ่กลุ่มอายุ 20 – 50 ปี
- รณรงค์ให้เน้นในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคคอตีบก่อน

เป้าหมายตัวชี้วัด

- ความครอบคลุม **dT** ในประชากร 20-50 ปี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
- ความครอบคลุมวัคซีน**MR**ในเด็กอายุ 2.6 -7 ปี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

เป้าหมายฉีดdT (20-50 ปี)

❖ เทศบาล	21,359 คน
❖ อ.เมือง	43,163 คน
❖ รวมเครือข่าย	64,522 คน

วัคซีน 1 โด๊ส ขนาด 0.5 ml. เป็นDiphtheria Toxoid

- ขนาด 1 ขวด บรรจุ 10

โด๊ส

- ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (IM)

ผลข้างเคียงของวัคซีนที่พบ

- อาการบวมแดง เจ็บเฉพาะที่พบได้บ่อย พบได้ 10 %
 - ปวดเมื่อยพบ 10-25 %
 - ไม่ค่อยมีไข้ และอาจพบเป็นตุ่มไตที่ผิวหนัง(ถ้าฉีดไม่ลึกถึงกล้ามเนื้อ)
 - อาการบวมเจ็บรุนแรง (**Arthus-like Reaction**) อาจพบได้บ้างมีอาการเจ็บจากหัวไหล่ไปถึงข้อศอกพบได้ 2- 8 ชม.หลังฉีด
- พบในผู้ที่มีภูมิต้านทานต่อ **Tetanus/Diphtheria** ในร่างกายสูงมาก กรณีนี้ควรฉีด **Booster** ภายใน 10 ปี

การดำเนินงาน

- ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทุกศสม.กำหนดเป้าหมาย
- ให้พัสดุดำเนินการจัดซื้อไซริงค์ เข็มให้เบิกที่เวชกรรมสังคม
- ประสานกับเทศบาลให้รณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ
- ให้พื้นที่รพ.สต./ ศสม.ดำเนินการเข้มข้น มค.-กพ.เก็บตกมีค.-เม.ย
- คีย์ข้อมูลในprg.Jhcis รหัสวัคซีน 901 รหัส Z23.5
- ให้ IC ดำเนินการฉีดในกลุ่มบุคลากรใน รพ.
- ให้รพ.สต.ส่งรายงานให้อำเภอ ศสม.รายงานให้เวชกรรมทุกเดือน

ประชาชนนอกเขตพื้นที่


- ให้บริการปกติ
- การคิดค่าธรรมเนียมครอบคลุมแต่ละพื้นที่ให้ศูนย์ข้อมูลดำเนินการ

ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน




อัตราการครอบคลุมวัคซีนเด็กอายุ 1 ปี อำเภอเมืองยะลา ปีงบประมาณ 2557

อัตรา




อัตราการครอบคลุมวัคซีนเด็กอายุ 5 ปี อำเภอเมืองยะลา ปีงบประมาณ 2557

ร้อยละ



อัตราการครอบคลุมของวัคซีนเด็กอายุ 1 ปี เครือข่ายอำเภอเมือง เดือน ต.ค. – ธ.ค. 57

ร้อยละ




เกณฑ์ ร้อยละ 95



อัตราการครอบคลุมของวัคซีนเด็กอายุ 5 ปี เครือข่ายอำเภอเมือง

เดือน ต.ค. – ธ.ค. 57

ร้อยละ



เกณฑ์ ร้อยละ 90



สวัสดี